Questions from Homework

⑤b) $\sin^2\theta + \frac{1}{2}\sin\theta = 0$

$\sin\theta\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\right) = 0$

$\sin\theta = 0$ | $\sin\theta + \frac{1}{2} = 0$

$\theta = 0°, 180°, 360°$ | $\sin\theta = -\frac{1}{2}$ ref $= 30°$

$0° + 360°k,\ k \in I$ | $\theta = 210°, 330°$

$180° + 360°k,\ k \in I$ | $210° + 360°k,\ k \in I$

$330° + 360°k,\ k \in I$

⑥d) $\dfrac{\cos 225°}{\sin 240° + \cos 60°}$





$$\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}}$$

$$\frac{-\frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{1-\sqrt{3}}{2}}$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{\cancel{2}} \times \frac{\cancel{2}}{1-\sqrt{3}}$$

$$\frac{-\sqrt{2}\ (1+\sqrt{3})}{(1-\sqrt{3})(1+\sqrt{3})}$$

$$\frac{-\sqrt{2} - \sqrt{6}}{1-3}$$

$$\frac{-\sqrt{2} - \sqrt{6}}{-2}$$

$$\boxed{\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2}}$$

Trig Identities

$$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} \qquad \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\cot\theta = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} \qquad \tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$$

$$1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$$

$$\csc\theta = \frac{1}{\sin\theta} \qquad \sin\theta = \frac{1}{\csc\theta}$$

$$\sec\theta = \frac{1}{\cos\theta} \qquad \cos\theta = \frac{1}{\sec\theta}$$

$$\cot\theta = \frac{1}{\tan\theta} \qquad \tan\theta = \frac{1}{\cot\theta}$$

$$\sin(x+y) = \sin x\cos y + \cos x\sin y$$

$$\sin(x-y) = \sin x\cos y - \cos x\sin y$$

$$\cos(x+y) = \cos x\cos y - \sin x\sin y$$

$$\cos(x-y) = \cos x\cos y + \sin x\sin y$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

$$\frac{1}{1+\sin\theta}+\frac{1}{1-\sin\theta}=2\sec^2\theta$$

$$\frac{1-\sin\theta+(1+\sin\theta)}{(1+\sin\theta)(1-\sin\theta)}$$

$$\frac{2}{1-\sin^2\theta}$$

$$\boxed{\frac{2}{\cos^2\theta}}$$

$$2\left(\frac{1}{\cos^2\theta}\right)$$

$$\boxed{\frac{2}{\cos^2\theta}}$$

$$\frac{1-\cos 2\theta}{1+\cos 2\theta} = \tan^2\theta$$

$$\frac{1-(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}{1+(\cos^2\theta-\sin^2\theta)}$$

$$\frac{1-\cos^2\theta+\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta-\sin^2\theta}$$

$$\frac{\sin^2\theta+\sin^2\theta}{\cos^2\theta+\cos^2\theta}$$

$$\frac{2\sin^2\theta}{2\cos^2\theta}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}$$

$$\frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}$$

$\tan^3\theta\sec^2\theta - \tan^3\theta = \tan^5\theta$

$\tan^3\theta(\sec^2\theta - 1)$ | $\tan^5\theta$

$\tan^3\theta(\tan^2\theta)$

$\tan^5\theta$

$$\frac{\cos^2 x - \sin^2 x}{\cos^2 x + \sin x \cos x} = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x}$$

$$\frac{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)}{\cos x (\cos x + \sin x)}$$

$$\frac{\cos x - \sin x}{\cos x}$$

Identities Final Review:

③ $\sin(x+y)\sin(x-y) = \cos^2 y - \cos^2 x$

$(\sin x\cos y + \cos x\sin y)(\sin x\cos y - \cos x\sin y)$

$\sin^2 x\cos^2 y - \cos^2 x\sin^2 y$

$(1-\cos^2 x)\cos^2 y - \cos^2 x(1-\cos^2 y)$

$\cos^2 y - \cancel{\cos^2 x\cos^2 y} - \cos^2 x + \cancel{\cos^2 x\cos^2 y}$

$\boxed{\cos^2 y - \cos^2 x}$

$\boxed{\cos^2 y - \cos^2 x}$

④ $\cos^4\theta = \boxed{1 - 2\sin^2\theta + \sin^4\theta}$

$(\cos^2\theta)(\cos^2\theta)$

$(1-\sin^2\theta)(1-\sin^2\theta)$

$1 - \sin^2\theta - \sin^2\theta + \sin^4\theta$

$\boxed{1 - 2\sin^2\theta + \sin^4\theta}$